

អាកប្បកិរិយានៃជំងឺផ្លូវចិត្ត
មួយចំនួនបង្កបញ្ហា


Behaviors that cause
concern

វគ្គបំណងរួម

១. រៀបរាប់ពី អាកប្បកិរិយាបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈកាចប្បហិង្សា
២. រៀបរាប់ពី អាកប្បកិរិយាបុគ្គលដែលមានការសង្ស័យ មានជំនឿប្លែក ឬ ឮសំលេង
៣. រៀបរាប់ពី អាកប្បកិរិយាបុគ្គលដែលគិតចង់សំលាប់ខ្លួន ឬ ព្យាយាមសំលាប់ខ្លួន
៤. រៀបរាប់ពីមនុស្សចាស់ ដែលមានបញ្ហាអាកប្បកិរិយា

វត្តបំណងទី១

រៀបរាប់បុគ្គលដែលមានលក្ខណៈ
កាចប្បហិង្សា



Aggressive behavior

- Aggressive behavior is behavior that causes physical or emotional harm to others, or threatens to. It can range from verbal abuse to the destruction of a victim's personal property. People with aggressive behavior tend to be irritable, impulsive, and restless.

<http://www.healthline.com/health/aggressive-behavior>

Violence

- Using or involving the use of physical force to cause harm or damage to someone or something : showing violence. : caused by physical force or violence.

[www.merriam webster.com/dictionary/violent](http://www.merriam-webster.com/dictionary/violent)

បុគ្គលដែលមានលក្ខណៈកាចប្តូរហឹង្សា

- លក្ខណៈកាចប្តូរហឹង្សាជាលក្ខណៈធ្វើអោយមនុស្ស មានការឈឺចាប់
- កាចដោយប្រើពាក្យសំដី



បុគ្គលមានលក្ខណៈកាចប្បហិង្សា(ត)

- កាចដោយស្រែកគំហក ឬ សំដីគំរោះគំរើយ
- កាច ដោយបំពានផ្នែករាងកាយ ដូចជា ការក្អិច វាយដំ ទះកំភ្លៀង
- ឆ្លង់ឆ្លរ ជាងនេះ ដូចជា ការប្រើ អាវុធ ដំបង កាំបិត ឬ កាំភ្លើង

សំណួរ

ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមានជំងឺផ្លូវចិត្ត មានលក្ខណៈកាច?

ចំណើយ

- វាមិនកើតមានចំពោះតែជំងឺផ្លូវចិត្ត ទេ
- ការស្តាប់ឮសំលេង ហើយខឹង ដោយសារអ្នកជំងឺគិតថា សំលេងនោះ និយាយអាក្រក់ពីខ្លួនគាត់។
- មានការជឿខុសៈ គិតថា មានមនុស្សដទៃ កំពុងរៀបចំផែនការ សំលាប់គាត់ ហើយធ្វើអោយគាត់ភ័យ ដូច្នេះហើយ ធ្វើអោយគាត់មានប្រតិកម្ម តបវិញ។

ចំណើយ (ត)

- ត្រូវ គេបញ្ឈប់ផែនការ និង ការស្រមៃស្រមៃ:

អ្នកជំងឺកំពុងមានផែនការដ៏ធំមួយ ហើយ ចង់ធ្វើអ្វីៗ

អោយ មានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិត របស់ខ្លួន

តែត្រូវ គេប្រាប់ថាមិនអាចទៅរួច ។ វាអាចកើតឡើងចំពោះ

អ្នកជំងឺមេនេ] (Mania).

Case study about mania

ខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានអារម្មណ៍ថា បើខ្ញុំមានថាមពលខ្លាំង វា
មិនត្រូវការដេកអ្វីទាំងអស់ ប៉ុន្តែការពិតខ្ញុំពិបាក
ដេកណាស់នៅថ្ងៃនោះ។ ខ្ញុំប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការ
រៀបចំប្រធានបទ និង គំរោងផែនការជាច្រើន ។

- I used to feel as if I had so much energy that not need to sleep at all. In fact, I hardly sleep in those days. I would rush about with all my schemes and plans.

Case study about mania (cont)

- ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលធ្វើវាអោយចប់ពិតប្រាកដទេ ។ ខ្ញុំ ធ្លាប់ទប់កំហឹងមិនបាននៅពេលអ្នកណា ម្នាក់ព្យាយាមបញ្ឈប់ខ្ញុំ។ នៅពេលមួយនោះខ្ញុំ ធ្លាប់ មានជំលោះយ៉ាងខ្លាំងជាមួយដៃគូរកស៊ី ពីផែនការដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ខ្ញុំ ។ But I never really managed to finish any of them properly. I used to lose my temper if any one tried to stop me. Once I got into big fighting with my business partner over one of my crazy scheme

Case study about mania (cont)

- ប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឡើងខ្លាំង ខ្ញុំមិនដែលទទួលស្គាល់ថា ខនងងខ្ពស់ទេ ។ ខ្ញុំពេលខ្លះទទួលអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានមហិមាពិសេសដែលអាចព្យាបាលអ្នកដទៃបាន។ ចំណុចខ្សោយនៃជំងឺរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវតែចាយលុយច្រើននៅពេលដែលគ្រួសារខ្ញុំ កំពុងតែគ្មានលុយ។
- But when I am high , I never realised how wrong I was. I even felt sometimes that I had special power to heal others. the worst thing about my illness how was I would spend so much money that I almost bankrupt the family.

ចំណើន (cont)

- មិនអាចដឹកស្រាបានទាន់ពេល:

នៅពេលអ្នកកំពុងញៀនស្រា ឬ ថ្នាំញៀនអ្នកមាន

អារម្មណ៍មិនសុខស្រួលក្នុងរាងកាយ ព្រោះតែសេចក្តីត្រូវ ការ

ដូច្នេះបើត្រូវ បានគេបញ្ឈប់ នោះនាំអោយ



អ្នកខឹង នឹងទៅជាកាច ។

មានការភ្លេចភ្លាំង

- អ្នកមានការលំបាកចងចាំ អ្នកមិនដឹងថា អ្នកនៅកន្លែងណា
- មិនចាំថ្ងៃណា ឬ ខែណា ឬអ្នកណាកំពុងនិយាយជាមួយអ្នក



អ្នកភ័យខ្លាច និងគិតថាអ្នកត្រូវការការពារខ្លួន

ទៅជនចម្លែកនោះ



អ្នកក្លាយជា ខឹង និង កាច

មូលហេតុនៃការភ្លេចភ្លាំង

- ទទួលបានស្រពាច្រើនពេក
- ជាតិស្ករក្នុងឈាមថយចុះ
- រលាកខួរក្បាល
- ខួរក្បាល

មានជំងឺផ្លូវចិត្ត

- មិនខុសពីមនុស្សជា
- អ្នកជំងឺផ្លូវចិត្ត ឆាប់អន់ចិត្ត ហើយក្លាយជាខឹង
- ករណីធ្ងន់ធ្ងរ នាំអោយបុគ្គលក្លាយជាកាច និង ប្រើ
ហិង្សា

តើត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងដូចម្តេច?

សំណួរសួរទៅ ភក្ត្រមគ្គីសារ ឬ មិត្តភក្តិ

- តើបុគ្គលមានអាការៈមួយម៉េច ជាច្រើនថ្ងៃហើយ?
- តើមានអ្វីកើតឡើងជាក់លាក់ ដូចជាការឈ្លោះប្រកែកគ្នា ពីការផឹកស្រា
- អាការៈកាច ដោយមិនដឹងមូលហេតុ ក៏រកឃើញមានណាស់
- តើបញ្ហានេះកើត មានពីមុនដែរឬទេ ? ប្រសិនបើធ្លាប់កើតមាន

នោះវានឹងអាចកើតមានឡើងម្តងទៀត

សំណួរសួរទៅ រកក្រុមគ្រួសារ ឬ មិត្តភក្តិ (ត)

- តើបុគ្គលឆាប់មានជំងឺផ្លូវចិត្តពីមុនដែរឬទេ?
តើគាត់កំពុងព្យាបាលដែរឬទេ?
- តើបុគ្គលនោះ ជឿទុកចិត្តអ្នកណា?
បុគ្គលនោះនឹងធ្វើអោយអ្នកដែលខឹងនេះ ស្ងប់ចិត្តបាន។
- តើបុគ្គលនោះ មានញៀនស្រា ឬ ថ្នាំញៀនដែរឬទេ?

សំណួរសួរបុគ្គលដែលកាច

- គួរសួរកហេតុផលដែលធ្វើអោយបុគ្គលកាច
- សួរគាត់ តើគាត់នៅតែខឹងដែរឬទេ? ប្រសិនជាគាត់នៅតែខឹង
- ស្នើរទៅគាត់ តើអ្នកគួរបន្តសំណួរទៀតឬ គាត់ចង់នៅម្នាក់ឯងបន្តិចសិន ។
- តើគាត់កំពុងមានភាពតានតឹងចិត្តដែរឬទេ ?

សំណួរសួរទៅ រកបុគ្គលដែលកាច (ត)

- សង្កេតអាកប្បកិរិយាប្លែកៗ របស់បុគ្គលដែលកាច
- សួរគាត់ តើអ្នកគិតថា មានអ្នកដទៃ កំពុងនៅជុំវិញអ្នកទេ?
- ប្រសិនជាមាន តើមនុស្សកំពុងធ្វើអ្វី ? តើពួកគេមាននិយាយអាក្រក់ ពីអ្នកដែរឬទេ?
-  ចង់ដឹងថា
តើបុគ្គលនោះមានរោគសញ្ញាវិកលចរិតដែរឬទេ?

សំណួរសួរទៅ ភក្តីបុគ្គលដែលកាច (ត)

- តើអ្នកធ្លាប់ឮមនុស្សនិយាយ អាក្រក់ពីអ្នកដែរឬទេ?
- តើអ្នកមានឮសំលេងមនុស្សនិយាយ ក្នុងត្រចៀក អ្នក
នៅពេលមិនមានមនុស្សនៅក្បែរដែរឬទេ?
- Hallucination មមាល ជាសញ្ញាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជំងឺរីកលចំរើន
មានទំនាក់ទំនងដោយការប្រើ គ្រឿងញៀន ឬការផឹកស្រា

លំនាំក្នុងការសម្ភាសន៍

- ត្រូវ ដឹងសញ្ញាដែលហៀបនឹងកើតមាន ហិង្សា:
- និយាយខ្លាំងៗ ឬ មានលក្ខណៈបំពារបំពានគំរាមគំហែង
- ក្តាប់ដៃ
- ដកដង្ហើមញាប់
- ទះតុ ឬ វាយជញ្ជាំង

លំនាំក្នុងការសំភាសន៍ (ត)

- ប្រាប់អោយដឹងថា សំដីនិយាយរបស់បុគ្គលគ្មានន័យ ឬ និយាយយ៉ាងញាប់ដែលជាសញ្ញាបង្ហាញអោយដឹងថា រាងកាយទទួលជាតិពុលច្រើន ឬ ជាសញ្ញានៃជំងឺរីកលចំរើន
- ដឹងពីក្លិនរបស់សុរា ឬ ស្នាមមូលចាក់ថ្នាំ (សញ្ញានៃការប្រើថ្នាំញៀន)
- សង្កេតមើលដំណើរទ្រេតទ្រោត (បាត់លំនឹង) ឬ សំដីច្រអូសដែលជាសញ្ញា បង្ហាញពីការមានជាតិពុលក្នុងខ្លួន ឬ ដោយថ្នាំញៀន ។

លំនាំក្នុងការសម្ភាសន៍ (ត)

- លោកអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីអារម្មណ៍ របស់ខ្លួនឯង ប្រសិនបើ អ្នកមានអារម្មណ៍ក៏យឺតយ៉ាវ អ្នកត្រូវបញ្ឈប់កិច្ចសម្ភាសន៍ **ដោយពិនិត្យ អោយច្បាស់ថា ទាំងអ្នក និង មនុស្សដែលអ្នកសម្ភាសន៍មានច្រក ចេញបានពីបន្ទប់ដូចគ្នា**
- អ្នកគប្បីនិយាយអោយច្បាស់ និងមានសំលេងស្រាល មិនត្រូវស្រែក ដាក់បុគ្គលដែលអ្នកសម្ភាសន៍នោះ បំណងអោយស្ងៀមស្ងាត់ឡើយ។

តើអ្វីដែលត្រូវ ធ្វើជាបន្ទាន់

- ជាដំបូងត្រូវព្យាយាមនិយាយ និងពន្យល់អោយបុគ្គលស្តាប់ អារម្មណ៍និងស្តាប់ការនិយាយរបស់គាត់
- មិនត្រូវប្រញាប់ធ្វើអោយស្ថានភាពស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកភ្លាមទេ
- អ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយគាត់ព្រម ទទួលថ្នាំរំងាប់អារម្មណ៍
- Lorazepam 1-2 mg
- Diazepam 5-10mg
- Antipsychotic Haloperidol 5 mg or chlorpromazine 50-100mg

តើអ្វីដែលត្រូវ ធ្វើជាបន្ទាន់ (ត)

- ប្រសិនបើគាត់មិនព្រមលេបថ្នាំ ហើយមានលក្ខណៈរំខានធ្ងន់ធ្ងរ នោះអ្នកត្រូវចាប់គាត់ចាក់ថ្នាំ
- ត្រូវត្រៀមថ្នាំជាមុន ដូចជា
- Diazepam 5-10mg I/M or I/V slow
- Haloperidol 5 mg -10 mg I/M
- chlorpromazine 25-100 mg I/V

តើ ពេលណាត្រូវ បញ្ជូន ?

- ប្រសិនបើសង្ស័យថា ការបង្កហិង្សានោះ
ជាប់ទាក់ទងនឹងភាពវង្វេងវង្វាន់ ឬ រូបសក្ខីកាល ឬ
ជំងឺខួរក្បាលដទៃទៀត
អ្នកត្រូវបញ្ជូនបុគ្គលនោះទៅមន្ទីរពេទ្យទូទៅ ។
ជាការប្រសើរ គប្បីមានបុគ្គលិកសុខភាពជូនគាត់ទៅ ។

អ្វីដែលត្រូវ ធ្វើជាបន្ត?

បញ្ជូនគាត់ទៅកាន់គ្រូពេទ្យ ឯកទេសវិកលវិទ្យា
ករណីគាត់មានជំងឺវិកលចរិត ដែលត្រូវការព្យាបាលបន្ត

វត្ថុបំណងទី២

បុគ្គលដែលមានការសង្ស័យ មានជំនឿប្លែក ឬ
ពួសំលេង

ការស្ទង់សំឡេង

- នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ ស្តាប់ឮសំឡេងមនុស្សដទៃកំពុង និយាយ

ដោយគ្មានអ្នកណានៅជិតនោះ លក្ខណៈ បែបនេះ គេហៅថា **មមាល**

Auditory hallucination ។

- ជារឿយៗ សំឡេងទាំងនោះ មានលក្ខណៈអវិជ្ជមាន ដែលនាំអោយ

បុគ្គលមិនសប្បាយចិត្ត ។

- **Illusion** = Mis interpretation
- **Hallucination** = **False Perception**
- **Delusion** = **False Belief**

ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមានលក្ខណៈបែបនេះ :

លក្ខណៈបែបនេះ វាមិនកើតមានញឹកញាប់ទេ

វាកើតឡើងចំពោះមនុស្សដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជា :

- ជំងឺ ស្លៀកប្រែ ដែលមានប្រវត្តិជំងឺលើសពី ៦ ខែ
- ជំងឺរីកលចំរើនដោយសារគ្រឿងញៀន
- Manic depressive illness

តើ មនុស្សធម្មតាមាន ឆ្លុះសំលេង ដែរ ឬទេ ?

- នៅក្នុងសហគមន៍ខ្លះ មានបុគ្គលមួយចំនួន អះអាងថា ពួកគេអាចនិយាយទាក់ទងជាមួយខ្មោច បិសាច បាន ដូច្នេះពួកគេអាចស្តាប់ឆ្លុះសំលេង ខ្មោច បិសាច ឬព្រះអាទិទេព ។ ពួកគេក៏មានជំនឿថា ព្រះអាទិទេព ឬ បិសាចកំពុង ខឹង អ្នកណាម្នាក់ ។

តើ មនុស្សធម្មតាមាន ឆ្លើយសំណួរ ដែរ ឬទេ ?

- ការឆ្លើយសំណួរនេះ គេមិនរកការព្យាបាលទេ
គេប្រើបទពិសោធន៍ទាំងនោះសំរាប់សុខភាពរបស់គេផ្ទាល់
និងជួយអ្នកដទៃដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទៀតផង។
ការឆ្លើយនេះមិនមែនជាការឆ្លើយសំណួរដូចក្នុងជំងឺផ្លូវចិត្តទេ ។ យើងគិតថាជាជំងឺ
លុះត្រា តែវា រំខានទៅលើជីវិតបុគ្គល និងគ្រួសាររបស់គេ។

វត្តបំណងទី៣

រៀបរាប់ពីអាកប្បកិរិយា
បុគ្គលដែលចង់សម្លាប់ខ្លួន
ឬព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួន

ការសម្លាប់ខ្លួន

គឺជាការបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯង។

ការសម្លាប់ខ្លួនចែកជា:

- មានគំនិតចង់សម្លាប់ខ្លួន
- ព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួន
- សម្លាប់ខ្លួនបានសម្រេច

Suicide

- Suicide Thought or Idea
- Suicide Attempt
- Complete Suicide or Suicide death

ក្នុងនាទីបុគ្គលិកសុខាភិបាល

ត្រូវស្វែងយល់ពីបុគ្គលដែលចង់សម្លាប់ខ្លួន
ឬព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួននិងផ្តល់ការគាំទ្រ



ហេតុអ្វីបុគ្គលចង់បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯង?



Video clip on suicide

- <https://fb.watch/ooeaXwhBfz/>

- មានមនុស្សជាច្រើន នៅពេលខ្លះគិតថា
រស់នៅប៉ុណ្ណឹងល្អមហើយ
- ប៉ុន្តែក៏នៅមានមនុស្សជាច្រើនដែរ រដ្ឋបស្ថានភាព
លំបាកនានាក្នុងជីវិត ហើយពួកគេបន្តរស់តទៅទៀត ។

មូលហេតុចម្លងនៃការ រងគ្រោះយាត

- ជំងឺផ្លាកទឹកចិត្ត ជាមូលហេតុចម្លងនៃការ រងគ្រោះយាត ។

ជំងឺផ្លាកទឹកចិត្តអាចធ្វើអោយបុគ្គល

មានការ រមែងផ្លាកច្របាច់ខ្លាំង

ចុះចំណុចការ ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងជីវិត និង

សេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគត។

មូលហេតុចម្បងនៃការធ្វើអត្តឃាត (ត)

- ការប្រើសុភាព និង ថ្នាំញៀន
- បញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃ
- ជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ
- ទំនាក់ទំនង រស់នៅមិនល្អ

មូលហេតុចំបងនៃការធ្វើអត្តឃាត (ត)

- ភាពក្រីក្រ និងការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
- ការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ ការសោកសង្រេង
- គ្មានមិត្តភក្តិពិគ្រោះយោបល់ និង ថែករំលែកអារម្មណ៍

ភេទ និង ការធ្វើ អត្តឃាត

- ស្ត្រីមានការព្យាយាមសំលាប់ខ្លួន ច្រើនជាងបុរស
ពីព្រោះស្ត្រីភាគច្រើន មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត
- ការសំលាប់ខ្លួនបានជោគជ័យ ភាពច្រើនជាបុរស ។

- តើ ត្រូវ រៀន ដោះស្រាយ បញ្ហា នេះយ៉ាង

ដូចម្តេច?

សំណួរទៅកាន់គ្រួសារ ឬ មិត្តភក្តិ

- តើមានអ្វីកើតឡើង?
- តើជាការប៉ុនប៉ងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែរឬទេ?
- ប្រសិនជាមនុស្សម្នាក់គាត់ព្យាយាមចងក ឬ ដឹកថ្នាំពុល (ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត) នោះជាការប៉ុនប៉ងបង្កគ្រោះថ្នាក់ ។
- តែបើគ្រាន់តែ យកប៊ូចឆ្កួតដែរ នោះមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់ទេ

សំណួរទៅកាន់បុគ្គលដែលសំលាប់ខ្លួន

តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នក ?

តើអ្នកមានគំនិតចង់សំលាប់ខ្លួនដែរឬទេ? ហេតុអ្វី?

តើអ្នកមានរៀបចំគំរោងដែរឬទេ?

ចាប់តាំងពីពេលណាមក?

តើអ្នកបានប្រាប់អ្នកដទៃពីគំរោងនោះដែរទេ ?

- ការរៀបចំគំរោងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
ដោយលាក់កំបាំងជាសំងាត់មានលក្ខណៈឆ្លងឆ្លុះ ។
- តើអ្នកមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តទេ ពេលថ្ងៃៗនេះ
តើអ្នកមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរស់នៅមែនទេ?
ការសួរបែបនេះ ផ្ដោតទៅលើជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត

ការពិនិត្យបុគ្គលដែលប៉ុនប៉ងសំលាប់ខ្លួន

- ជាគោលការណ៍អ្នកត្រូវបញ្ជូនបុគ្គលដែលចង់សំលាប់ខ្លួនទៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិត (ប្រសិនបើអាច)
- ករណីចងក ចាក់នឹងវត្ថុអ្វីមួយ បាញ់ដោយកាំភ្លើង , កាត់ ឬដុត បែបនេះត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់សិន មុនបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ អ្នកត្រូវពិនិត្យ ដង្ហើម សំពាធឈាម និង ជីពចរ។ ព្យួរស្បែក បើបុគ្គលមានសំពាធឈាមទាប។
- ករណីប្រើថ្នាំពុលសត្វល្អិតឬសកំរិត ឬ សារធាតុផ្សេងទៀត៖
- ត្រូវធ្វើអោយគាត់ក្អកតាមវិធី
ជីកទឹកអំបិលប្រែខ្លាំង
- ផ្តល់ទឹកកំហាប់នៃម្សៅឆ្ងៀង ដើម្បីស្រូបជាតិពុល

ការសំលាប់ខ្លួនអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្ម

- នៅប្រទេសខ្លះការសំលាប់ខ្លួនជាបទឧក្រិដ្ឋ ជាករណីផ្ដេរច្បាប់ ឬ ករណីដែលនគរបាលត្រូវតាមដាន។
- បើអ្នកពិនិត្យដឹងថាការប៉ុនប៉ងសំលាប់ខ្លួនទាក់ទងនឹងភាពតានតឹងចិត្ត អ្នកពុំចាំបាច់រាយការណ៍ទៅប៉ូលីសទេ
- បើការប៉ងសំលាប់ខ្លួនរបស់ស្ត្រីទាក់ទងនឹងការធ្វើបាបរបស់ប្តី ឬ សាច់ថ្លៃ នោះអ្នកអាចរាយការណ៍បាន បើមានការយល់ព្រមពីប្រពន្ធ

ការជួយអ្នកដែលចង់សំលាប់ខ្លួន

- Reduce poverty
- Take away the availability of tools which clients can use to commit suicide.
- Reduce level depression of the client.
- Suicide counseling.
- Let client to think the reason that he/she want to live (divert thinking)

វត្តបំណងទី៦

រៀបរាប់ពីមនុស្សចាស់ដែលមានបញ្ហាអាកប្បកិរិយា



- លក្ខណៈវង្វេងច្រឡំ និងកាចអាចកើតមានចំពោះមនុស្សចាស់
- បងប្អូនអ្នកជំងឺខ្លះ ត្រូវតែរកមនុស្សចាស់បានប្រព្រឹត្តិផ្លូវភេទមិនសមរម្យ ឬទទួលបានដើរចេញក្រៅផ្ទះទោះបីជាគាត់មានលក្ខណៈវង្វេងវង្វាន់ក្តី
- អាកប្បកិរិយាផ្សេងទៀតគឺ មនុស្សចាស់ផ្តាច់ខ្លួនពីគេឯងនិងមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយអ្វីៗឡើយ។ លក្ខណៈបែបនេះវាមិនមែនជាបញ្ហាទេ តែវាជាជំងឺផ្លូវចិត្តម្យ៉ាង។

ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សចាស់មានលក្ខណៈបែបនេះ?

- មានហេតុផល៤យ៉ាង៖
- ១. ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត៖ លក្ខណៈទូទៅរបស់មនុស្សចាស់គឺផ្តាច់ខ្លួនចេញពីគេក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ មិនចង់ទទួលទានអាហារ សំរាទមិនលក់ និងត្អូញត្អែរពីបញ្ហារាងកាយ។ មនុស្សចាស់ខ្លះចង់ធ្វើអត្តឃាត
- ២. ការរើវាយ ឬរងរងរង្វាន់៖ មានសភាពស្រួចស្រាល់ហើយអាកប្បកិរិយាអាចនឹងកើតឡើងភ្លាមរយៈពេល២ទៅ៣ ថ្ងៃ ។ គាត់អាចមានមមាល និងជ្រួលជ្រាល

ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សចាស់មានលក្ខណៈបែប នេះ?(ត)

- **៣. វិកលចរិត៖** កើតឡើងលើមនុស្សចាស់ដែលមាន
ជំងឺវង្វេងវង្វាន់ភ្លេចភ្លាំង (Dementia) ដែលគាត់
មានរោគសញ្ញា មមាល និង ចេះតែសង្ស័យ
- **៤. ជំងឺវង្វេងស្មារតី៖** កើតលើវ័យចាស់ពិសេសចាប់
ពី ៦៥ ឆ្នាំឡើងទៅ ។ សញ្ញាដំបូងនៃជំងឺគឺបញ្ហានៃការ
ចងចាំ។
- បុគ្គលិកសុខាភិបាលងាយចាប់អារម្មណ៍ពីជំងឺនេះ
ដោយសារបញ្ហាអាកប្បកិរិយា។ ជំងឺវង្វេងស្មារតី
(Dementia) ជាជំងឺដែលខ្វះខាតចុះថយសមត្ថភាព
ជាលំដាប់។ វាមិនមានការព្យាបាលអោយជាដាច់ទេ

ឯកសារសំអាង

- ទីណាគ្មានវេជ្ជបណ្ឌិតសុខភាពផ្លូវចិត្ត ទំព័រ ៧៧ ដល់ ១១៦
- Where there is no psychiatrist Pages
- <http://www.healthline.com/health/aggressive-behavior>
- www.merriamwebster.com/dictionary/violence